

แบบรายงานผลกาดำเนินงาน  
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก  
กองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านหัน  
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน  
รายงาน ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.หน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว

๒.งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน.....๙,๖๔๐..... บาท

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ในการดำเนินงานโครงการ.....๙,๖๔๐.....บาท

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ .....-..... บาท

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ผู้ได้รับเงินสนับสนุนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุน เลขที่ ๐๐๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ ผู้ได้รับเงินสนับสนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน.....ฉบับจำนวนเงิน ๙,๖๔๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป


๓.๓ ผู้ได้รับเงินสนับสนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท คืนมาพร้อมหนังสือนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

๓.๔.๑ ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีความเข้าใจเรื่องการใช้ยา ปฏิชีวนะ ยาเสพติดอย่างปลอดภัยและสมเหตุ สมผล

๓.๔.๒ มีการเฝ้าระวังร้านค้า ร้านขายของชำ ไม่มีขายยาชุด ยาผสมเสียดียรรยด์

๔. ผู้ได้รับเงินสนับสนุนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก..... จึงขอส่งเงินคืน จำนวน..... บาท (.....) มาพร้อมหนังสือนี้

  
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(...นางแววดาว บุตรราช....)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่น ต.บ้านหัน

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่น ต.บ้านหัน

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว

อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่น ต.บ้านหัน เป็นเงิน ๙,๖๔๐ บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

#### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลของคนในชุมชนเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีปัจจัยที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งจากตัวผู้ใช้ยาเอง ผู้สั่งใช้ยา ตลอดจนการควบคุมตามกฎหมาย ดังนั้นการดำเนินการจึงต้องใช้มาตรการที่หลากหลายทั้งความร่วมมือของหลายภาคส่วน หลายระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว มีหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน มีร้านค้า ร้านชำ ทั้งหมด ๑๙ ร้าน และจากการสำรวจร้านค้า พบว่ามีร้านค้าร้านชำอีกหลายร้านที่นำยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านมาขายให้แก่คนในชุมชนและจากการสอบถามผู้ประกอบการเกี่ยวกับพิษภัยของยา ปรากฏว่าไม่มีความรู้และไม่ทราบถึงผลข้างเคียงที่ตามมา จากการดำเนินงานเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคตลอดมา ได้เพียงให้คำแนะนำและให้ความรู้และยังไม่สามารถลดการนำปฏิกิริยาของยาในชุมชนได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงคิดหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาในชุมชนมีความชัดเจนและสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาชุดและการใช้ยาสเตียรอยด์ โดยไม่จำเป็นเพื่อให้คนในชุมชนมีการพัฒนาการจัดการเรื่องยาให้สมเหตุสมผลและปลอดภัยในระยะยาวต่อไป

#### ๑.วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย

๑.๑ เพื่อให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีความเข้าใจเรื่องการใช้ยา ปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์อย่างปลอดภัยและสมเหตุ สมผล

๑.๒ เพื่อเฝ้าระวังร้านค้า ร้านขายของชำ ไม่มีขายยาชุด ยาผสมสเตียรอยด์

#### วัตถุประสงค์เฉพาะ

๑.๑ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงการใช้ยาสเตียรอยด์ในพื้นที่

๑.๒ เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้ยาสเตียรอยด์

#### กลุ่มเป้าหมาย

ร้านค้า ร้านขายของชำ ไม่มีขายยาชุด ยาผสมสเตียรอยด์ ในหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน

#### ๒.วิธีการดำเนินงาน

๑. จัดทำโครงการเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติดำเนินการ

๒. สืบจากกลุ่มเป้าหมาย และร้านค้า ร้านชำ

๓. จัดทำเอกสารคู่มือความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

๔. แจ้งประสาน อสม. ประชาสัมพันธ์



๕. จัดอบรม

๖. เฝ้าระวังการจำหน่ายยาเสพติดรายเดือนในชุมชน

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๘. ปรับปรุง พัฒนาจากผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ต่อไป

๓. สถานที่ดำเนินงาน

พื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านวังยาว ๗ หมู่บ้าน ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕

๕. งบประมาณ

จากงบประมาณสนับสนุน ประเภทที่ ๑ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน  
สาธารณสุข ของกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่น ต.บ้านหัน รายละเอียดดังนี้

๑. ค่าสื่อศึกษาพร้อมเอกสารความรู้เรื่องยา และอันตรายจากการใช้ยา สติยรอยด์ ของร้านค้า ร้าน

จำนวน ๑๙ ชุด ชุดละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๕๐ บาท

๒. ค่าสื่อศึกษาพร้อมเอกสารความรู้เรื่องยา และอันตรายจากการใช้ยา สติยรอยด์ ประชาชนใน

ชุมชนและกลุ่มผู้ขายยาเสพติด กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบจำนวน ๗

หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ ชุด ชุดละ ๕๐ บาทจำนวน ๒๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๑๕๐ บาท

๓. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน X ๒๔๐ บาท X ๑ วัน X ๗ หมู่บ้าน เป็นเงิน ๕,๐๔๐ บาท

๔. ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๙,๖๔๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม

๖. การประเมินผล/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การประเมินผล

๑. จำนวนผู้ขายยาเสพติด และยาชุดลดลง

๒. ประเมินผลจากการนำยาชุดเข้ามาจำหน่ายในร้านค้า ร้านชำ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการขายยา ปฏิชีวนะ ยาเสพติดอย่างปลอดภัยและสมเหตุ  
สมผล

๒. ร้านค้า ร้านขายของชำ ไม่มีขายยาชุด ยาผสมสติยรอยด์

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับการ  
จำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

๗.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.

๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .....โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว.....

☒ ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

๗.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

☒ ๗.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

[ข้อ ๗(๑)]

๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.

๒๕๕๗)

☒ ๗.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง



๗.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

☒ ๗.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง


☒ ๗.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

☒ ๗.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

☒ ๗.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

☒ ๗.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ

ลงชื่อ .....  ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางนภาพร พันปี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ .....  ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวจำลองรัตน์ มีฐาน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว







# 2

ประเภทยาที่ขายใน  
ร้านชำได้  
และไม่ได้  
ประเภทยาแบ่งได้ 2 กลุ่ม



## ประเภทที่ 1

### ยาสามัญประจำบ้าน

กลุ่มยาประเภทนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านชำ

- ผู้ขายไม่ผิดกฎหมาย
- อันตรายค่อนข้างน้อยกว่า
- รักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้



ยาต้ม



ยาหม่อง



ยาลดไข้ บรรเทาปวด

## ประเภทที่ 2

### กลุ่มยาอันตราย

กลุ่มยาประเภทนี้ **ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านชำ** ต้องจ่ายโดยแพทย์  
ยากลุ่มนี้จะต้องพิจารณาการใช้โดยแพทย์ หรือเภสัชกร

- ผู้ขายมีความผิด หากไม่ได้รับอนุญาตจำหน่าย
- อันตรายค่อนข้างมากหากไม่ได้ควบคุมโดยแพทย์
- รักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วย อาทิเช่น ยาปฏิชีวนะ  
ยาแก้ชัก ยาชุดหรือยาลูกกลอนที่ไม่มีเลขทะเบียนยา  
โรคเรื้อรัง, ความดัน อื่นๆ



ยาปฏิชีวนะ



ยาชุดหรือยาลูกกลอน  
ที่ไม่มีเลขทะเบียนยา



ยาแก้ชัก

**“ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกซื้อยา ”**



ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ



[www.tawaiforhealth.org](http://www.tawaiforhealth.org)



# “รู้ไว้ ใช้ว่า” ก่อนซื้อยาจากร้านขายของชำ



ร้านขายของชำ เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน  
รู้หรือไม่ว่า ? เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วไปซื้อยาในร้านชำ ทำให้มีความเสี่ยง  
ที่จะได้รับอันตราย

ซื้อยาในร้านชำกินเอง เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง ?



เกิดภาวะดีซ่าน  
รับประทานไม่ได้ ผลในอนาคต



แพ้ยา เช่น เกิดผื่น ปากบวม  
หน้าบวม ผิวหนังลอก



ผลเสียต่อร่างกาย  
เช่น ภาวะไตวาย กระเพาะทะลุ

## เราเคยพบยาประเภทใด ในร้านชำ

จากการสำรวจร้านขายของชำ  
332 แห่งใน จ.พิษณุโลกพบว่า  
47.9% จำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสม  
โดยพบกลุ่มยาที่ห้ามจำหน่ายคือ



82.4%

ยาอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ว่า  
ยาปฏิชีวนะ หรือยาอื่น  
ที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน



9.4%

ยาชุด



62.3%

ยาปฏิชีวนะ



3.8%

ยาที่มี  
สเตียรอยด์



\*การจำหน่ายยาในร้านชำถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยกเว้นยาสามัญประจำบ้าน



ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ



www.tawaiforhealth.org







## 2

ประเภทยาที่ขายใน  
**ร้านชำได้**  
**และไม่ได้**  
ยาแบ่งได้ 2 กลุ่ม



## ยาสามันญะประจําบ้าน



**กลุ่มยาอันตราย**



“ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกซื้อยา ”



 **ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ**  **www.tawaiforhealth.org**



# “รู้ไว้ ใช้ว่า” ก่อนซื้อยาจากร้านขายของชำ



ร้านขายของชำ เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้กับคนไทยมานาน  
รู้หรือไม่? เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วไปซื้อยาในร้านชำ ทำให้มีความเสี่ยง  
ที่จะได้รับอันตราย

ซื้อยาในร้านชำกินเอง เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง?



เกิดภาวะดีอยา  
รับประทานไม่ได้ผลในอนาคต



แพ้ยา เจ็บ เกิดผื่น ปากบวม  
หน้าบวม ผิวหนังลอก



ผลเสียต่อร่างกาย  
เช่น ท้องไส้ติ่งอักเสบ กระเพาะทะลุ

## เราเคยพบยาประเภทใดในร้านชำ

จากการสำรวจร้านขายของชำ  
332 แห่งใน จ.พิษณุโลกพบว่า  
47.9% จำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสม



82.4%

ยารักษาโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิธี  
ยาปฏิชีวนะ ยารักษาโรค  
ที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน



9.4%

ยาชุด



62.3%

ยาปฏิชีวนะ



3.8%

ยาที่มี  
สเตียรอยด์



\*การจำหน่ายยาในร้านชำถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยกเว้นเภสัชกรประจำบ้าน



ทาว์ รู้ทันภัยสุขภาพ



www.tawalforhealth.org











๒. การแสดงเอกสารกำกับยาพาราเซตามอลสำหรับประชาชน

**พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด**  
[ชื่อการค้า]

**คำเตือน**  
"ระมัดระวังการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้"

**1. ยาชนิดนี้อะไร**  
• ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด  
• ยาใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

**2. ข้อควรระวังการใช้ยา**  
2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไหร่  
❌ ห้ามใช้กับผู้เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนผสมอื่นในสารบัพ  
❌ ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนเสียชีวิตได้  
❌ หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอล เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด  
2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา  
• ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาที่มีฤทธิ์กดระบบหายใจ (GPR) หรือกำลังกินยาค่านการแข็งตัวของเลือดหรือฟาร์ริน เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

• ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากมีสภาวะเป็นประจํา เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้  
• ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

| 3. วิธีใช้ยา          |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 ขนาดและวิธีใช้    |                                                                                                 |
| น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) | ขนาดยา                                                                                          |
| น้อยกว่า 34           | ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร                                                                       |
| ตั้งแต่ 34 ถึง 50     | กินยาครั้งละ 1 เม็ด และครั้งทำงานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพราะเวลาปวดหรือมีไข้                      |
| มากกว่า 50 ถึง 67     | กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง และครั้งทำงานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง               |
| มากกว่า 67            | กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง และครั้งทำงานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพราะเวลาปวดหรือมีไข้ |

3.2 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรหาอย่างไร  
รีบไปพบ แพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมากและได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา**  
• ไม่กินยาลดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร  
• ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของไข้ไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของไข้ไม่บรรเทาภายใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**  
5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น  
• ขวบที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ  
• หน้ามืด เป็นลม แสบหน้าอก หายใจลำบาก  
• ผื่นแดง คื่นหอย ผิวหนังหลุดลอก  
• มีอาการผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย  
ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น  
• อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น  
ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

**6. ควรเก็บยาคืออย่างไร**  
• เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่ได้รับมา  
• แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น  
• เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ ...<ปริมาณที่เหมาะสม>... องศาเซลเซียส  
• เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา**  
รสลักษณะและสีของยา และส่วนประกอบในตำรับ ...<ปริมาณที่เหมาะสม>...  
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....  
เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ.....

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัย  
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร



ภาพเหล่านี้ เป็นยาอันตราย ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันเท่านั้น

ภาพเหล่านี้ เป็นยาอันตราย ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันเท่านั้น

การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี  
การรับประทานยาอันตรายอย่างไม่เหมาะสม จะมีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น กระตุกๆ ไตวาย  
กระเพาะอาหารทะลุ ภูมิคุ้มกันต่ำ เจ็บป่วยจะรักษาให้หายยากและสิ้นเปลืองเงิน  
“ร้านชำสามารถจำหน่ายได้เฉพาะยาสามัญประจำบ้านเท่านั้น”

